

TREŚĆ OZNAKOWANIA OPAKOWANIA

Podmiot odpowiedzialny: BASF Polska Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 142b, 02-305 Warszawa, tel.: 22 570 99 99, fax: 22 570 97 92, e-mail: poczta@basf.com

W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi w treści oznakowania opakowania.

MYTHIC GEL

Preparat owadobójczy w formie żelu gotowego do użycia, przeznaczony do zwalczania karaczanów: karaczana prusaka, przybyszki amerykańskiej.

Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania.

Zawartość substancji czynnej:
chlorfenapyr 4 g/kg

Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 6017/14



UWAGA

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Unikać uwolnienia do środowiska.

Zebrać wyciek.

Zawartość/pojemnik usuwać do punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

ZAKRES STOSOWANIA I DAWKI

Preparat owadobójczy w formie żelu gotowego do użycia, przeznaczony do zwalczania karaczanów: karaczana prusaka (*Blattella germanica*) i przybyszki amerykańskiej (*Periplaneta Americana*). Zwalcza skutecznie zarówno osobniki dorosłe, jak i nimfy.

MYTHIC GEL może być stosowany w pomieszczeniach mieszkalnych (kuchnie, łazienki); w miejscach związanych z przetwórstwem, przechowywaniem i przygotowaniem żywności, takich jak: pomieszczenia produkcji spożywczej, kuchnie, restauracje, kawiarnie, magazyny spożywcze, sklepy spożywcze; w magazynach; w punktach handlowych; w obiektach użyteczności publicznej takich jak: biura, hotele, ośrodki wczasowe, przychodnie, szpitale, więzienia, koszary wojskowe, teatry, kina; w pomieszczeniach handlowych i przemysłowych takich jak: fabryki, sklepy, warsztaty oraz w środkach transportu: na pokładach samolotów, na statkach, itp.

Preparat działa na owada od momentu spożycia preparatu lub kontaktu z nim.

Preparat stosować w następujących dawkach:

Normalna dawka:

- Karaczan prusak – jedna kropla żelu o masie 0,1g / m²
- Przybyszka amerykańska – trzy krople żelu o masie 0,1g / m²

W przypadku dużej inwazji szkodników, w miejscach wyjątkowo brudnych, zastawionych lub gdzie niemożliwe jest całkowite wyeliminowanie innych źródeł pokarmu, należy zastosować wyższe dawki:

- Karaczan prusak – dwie krople żelu o masie 0,1g / m²
- Przybyszka amerykańska – trzy krople żelu o masie 0,1g / m²

Średnica kropli o masie 0,1g wynosi ok. 4 – 5 mm.

SPOSÓB WYKONANIA ZABIEGU

Preparat należy stosować w pobliżu lub w miejscach skupisk, wędrówek oraz żerowania owadów. Są to zazwyczaj ciemne, ciepłe, wilgotne i osłonięte miejsca (pęknięcia, szczeliny, sprzęt elektryczny ustawiony przy ścianie, zlewy). Aby zidentyfikować takie miejsca, należy przeprowadzić obserwację lub zastosować pułapki. Dla uzyskania lepszej skuteczności przed zastosowaniem produktu należy umyć i wysprzątać pomieszczenia, a w szczególności należy usunąć alternatywne źródła pokarmu dla karaczanów.

MYTHIC GEL należy stosować w postaci małych kropli, które należy umieszczać w ciemnych i osłoniętych miejscach: pęknięcia, szczeliny, miejsca za szafkami i półkami, pod urządzeniami kuchennymi, w szuflach elektrycznych, w pustych przestrzeniach i przewodach wentylacyjnych oraz pod urządzeniami sanitarnymi.

Nie stosować produktu MYTHIC GEL w miejscach, gdzie może zostać zalany lub zmyty podczas normalnych zabiegów sprzątania.

Nie stosować innych produktów owadobójczych w pobliżu lub w miejscach zastosowania produktu MYTHIC GEL. Nie stosować produktu MYTHIC GEL w miejscach, gdzie wcześniej zastosowano inny środek. Może to zniechęcić owady do pobierania żelu.

MYTHIC GEL najlepiej stosować za pomocą specjalnego pistoletu-aplikatora albo innego, podobnego dozownika.

Pomieszczenia, gdzie zastosowano produkt, należy ponownie sprawdzić po upływie 2 – 3 tygodni. W przypadku dużej inwazji szkodników, jeśli preparat został całkowicie spożyty i nadal obserwuje się występowanie żywych karaczanów, zabieg należy powtórzyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA PREPARATU

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą

Przed przerwami lub po zakończeniu pracy umyć ręce.

Zapobiec przedostaniu się do gleby/gruntu. Zapobiec przedostaniu się do kanalizacji/wód powierzchniowych/wód gruntowych.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI PRODUKTU I OPAKOWANIA

Zabrudzone przedmioty i podłogę czyścić gruntownie wodą i środkami powierzchniowo-czynnymi z zachowaniem przepisów o ochronie środowiska. Zebrany materiał, zużyte opakowania i pozostałości produktu usuwać w sposób bezpieczny zgodnie z przepisami (np. utylizować lub unieszkodliwiać w autoryzowanych firmach).

Odpady zbierać oddzielnie w odpowiednich, oznakowanych i dających się zamknąć pojemnikach

Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania:

BRAK

PIERWSZA POMOC I INFORMACJA DLA LEKARZA

W przypadku dostania się do dróg oddechowych: spokój, świeże powietrze

W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem.

W przypadku zanieczyszczenia oczu: zdjąć soczewki kontaktowe, płukać przez 15 minut pod bieżącą wodą przy szeroko otwartych oczach; konsultacje okulistyczne.

W przypadku połknięcia: wypłukać usta i popić dużą ilością wody; w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub z lekarzem.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać wyłącznie w bezpiecznym miejscu, w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 30°C, z dala od źródeł ciepła.

Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.

Chronić przed dostępem wilgoci.

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt

Okres ważności: 2 lata od daty produkcji

Data produkcji:

Nr serii:

Zawartość netto:

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
NIP: 521-32-14-182 REGON: 015249601

Z upoważnienia Prezesa
WICEPREZES
ds. Produktów Biobójczych
Barbara Jaworska-Luczak

2018 -10- 19