

Fourmidor®

**Wysokiej jakości preparat do zwalczania mrówek,
zapewniający całkowitą likwidację kolonii**

- Skuteczna substancja aktywna – fipronil
- Specjalna, wabiąca forma użytkowa na bazie spadzi
- Błyskawiczna i całkowita likwidacja kolonii
- Szybki i łatwy w stosowaniu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń



Fourmidor®

Fourmidor® to nowy insektycyd, szczególnie wartościowy dla profesjonalistów ze względu na niezawodność w zwalczaniu mrówek.

Fourmidor® to gotowa do użycia przynęta z substancją czynną fipronil, która znana jest ze swojej skuteczności.

Fourmidor® wykorzystuje występującą u mrówek naturalną skłonność do dzielenia się pokarmem, co prowadzi do szybkiej i całkowitej likwidacji kolonii.

Fourmidor® jest szybki i prosty w aplikacji dzięki opakowaniu z dostosowaną do formulacji igłą.

Skuteczna substancja aktywna – fipronil

Fourmidor® to nowy preparat dla profesjonalistów, który łączy niezawodność i skuteczność substancji aktywnej fipronil, znanej z preparatu do zwalczania karaczanów Goliath® Gel.

Należący do grupy fenylopirazoli, fipronil jest niesamowicie silną substancją zaburzającą działanie centralnego układu nerwowego, skuteczną w niskich dawkach.

W przeciwieństwie do organofosforanów, karbaminianów czy pyretroidów, fipronil działa na receptory GABA w kanale chlorkowym zakłócając przekaz impulsów elektrycznych, co prowadzi do śmierci poprzez nadmierne pobudzenie.

Dzięki temu jest niezwykle cenny, zwłaszcza w programach mających na celu ograniczenie wykształcania odporności u owadów.

Specjalna, wabiąca forma użytkowa na bazie spadzi

Fourmidor® skutecznie zwalcza hurtnicę pospolitą (*Lasius niger*) i podziemnicę zwyczajną (*Lasius flavus*) oraz inne gatunki mrówek, należące do podrodziny Formicinae, jak np. mrówka anatolijska (*Lasius neglectus*), koczownicza czarna (*Tapinoma erraticum*), murawka darniowiec (*Tetramorium caespitum*).

Specjalna, wabiąca forma użytkowa na bazie słodkiej spadzi, bardziej płynna niż klasyczne żele, opracowana została na podstawie badań i doświadczeń, które potwierdziły wyższą atrakcyjność takiej formy przynęty dla robotnic.

Powoduje nieodpartą chęć pobrania przynęty przez żerujące mrówki, które nie są w stanie wykręcić obecności substancji owadobójczej.

Dzięki swojej atrakcyjności i przesunięciu działania w czasie preparat jest pobierany natychmiastowo. Następnie mrówki przenoszą preparat do gniazda, gdzie dzielą się nim z całą kolonią (trofalaksja).



Błyskawiczna i całkowita likwidacja kolonii


Stężenie 0,05% fipronil-u w przynęcie specjalnie dobrano, aby mrówki po pobraniu preparatu **Fourmidor®** miały wystarczająco dużo czasu, aby podzielić się smakowitą spadzią z innymi osobnikami w kolonii przed swoją śmiercią.

Badania potwierdzają, że **Fourmidor®** wykazuje działanie bójcze po upływie 12-24 godzin od pobrania.

Osobniki dorosłe, larwy i królowe są zwalczane nawet po spożyciu niewielkiej dawki preparatu, co prowadzi do całkowitej likwidacji kolonii w ciągu 10-14 dni.

Fourmidor® to szybsze działanie i większa skuteczność w porównaniu z innymi powszechnie stosowanymi preparatami do zwalczania mrówek.

Testy laboratoryjne skuteczności działania Fourmidor® na kolonię hurtnicy zwyczajnej (*Lasius niger*)



Szybki i łatwy w stosowaniu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Fourmidor® to gotowa do użycia przynęta w formie płynnego żelu, którą można szybko, łatwo i precyzyjnie aplikować bez potrzeby rozcieńczania i używania opryskiwaczy.

Zaprojektowany do użytku zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i komercyjnych, jest praktycznie bezwonny dla ludzi. W przypadku stosowania na zewnątrz, produkt należy umieścić w karmnikach dezynsekcyjnych, a gdy nie jest to możliwe, stosować w pęknięciach i szczelinach, pod przykryciem, tak aby minimalizować ryzyko zmycia przez deszcz, czy też pobrania przez inne organizmy.

Nie ma szczególnych wymagań, jeśli chodzi o przenoszenie, przechowywanie czy przygotowanie do aplikacji. Preparat pozostaje skuteczny przez swój okres ważności.

Fourmidor®

Wysokiej jakości preparat do zwalczania mrówek, zapewniający całkowitą likwidację kolonii

Skuteczność zapewniająca maksymalne korzyści

Fourmidor® jest dostępny w 25 gramowym opakowaniu z dozownikiem, który pozwala na szybką i łatwą aplikację.

Zaleca się stosować jedną kroplę preparatu o średnicy 3-4 milimetrów (masa ok. 0,03 grama) co 30 centymetrów wzdłuż ścieżek owadów.

W celu zapewnienia maksymalnej stabilności i skuteczności, krople preparatu należy aplikować na niechłonne poziome powierzchnie. Preparat użyty na zewnątrz pomieszczeń należy chronić przed zmyciem, stosując specjalne karmniki na przynęty żelowe lub odpowiednie osłony, jeśli jest to możliwe.

Po upływie 1-2 tygodni zaleca się inspekcję miejsca, gdzie przeprowadzono zabieg. Całkowity pobór przynęty oraz dalsza obecność mrówek wskazują na dużą lub trudną do zwalczania populację mrówek, dlatego drugi zabieg preparatem może być wymagany.

W przypadku stosowania zgodnie z zaleceniami jedno 25-gramowe opakowanie **Fourmidor®** wystarczy do przeprowadzenia zabiegu na około 250 metrach ścieżek mrówek.

Fourmidor® jest zastrzeżonym znakiem towarowym BASF. Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

Więcej informacji można uzyskać od:

BASF Polska Sp. z o.o. – Professional & Specialty Solutions
Aleje Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa
tel. (22) 570 98 29
www.pestcontrol.basf.pl



 **BASF**
We create chemistry

